

  
**PLENVU®**  
Powder for Oral Solution  
PEG 3350, Sodium Ascorbate, Sodium Sulfate, Ascorbic Acid, Sodium Chloride, and Potassium Chloride  
140g | 48.11g | 9g | 7.54g | 5.2g | 2.2g

## Dawkowanie w dniu kolonoskopii rano\*

Jeśli pacjent przyjmuje lek PLENVU® rano w dniu kolonoskopii,  
**oto instrukcja przygotowania się do zabiegu**

Data kolonoskopii: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Miejsce kolonoskopii: \_\_\_\_\_

Czas kolonoskopii: \_\_\_\_\_ RANO/WIECZOREM Zakaz picia po: \_\_\_\_\_ RANO/WIECZOREM

### PORANEK W DNIU KOLONOSKOPII

#### PLENVU® Dawka 1:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dzień tygodnia: Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nie.

Godzina: \_\_\_\_\_ RANO

#### PLENVU® Dawka 2:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dzień tygodnia: Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nie.

Godzina: \_\_\_\_\_ RANO/WIECZOREM



Uwaga: rzeczywisty roztwór jest bezbarwny.

**Należy zaprzestać picia płynów na co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią lub zgodnie z zaleceniem lekarza.**

#### Przyjmij Dawkę 1

1. W naczyniu do mieszania wymieszaj zawartość saszetki Dawka 1 z co najmniej 16 fl oz (450 ml) wody łyżką lub wstrząsając do momentu całkowitego rozpuszczenia. Może to potrwać do 2–3 minut. Nie spiesz się—powoli przyjmij dawkę w ciągu 30 minut.
2. Ponownie napełnij pojemnik co najmniej 16 fl oz (450 ml) klarownego płynu. Spokojnie wypij całość w ciągu 30 minut.

#### ODCEKAJ CO NAJMNIEJ 2 GODZINY OD ROZPOCZĘCIA DAWKI 1, A NASTĘPNIE

#### Przyjmij Dawkę 2

1. W naczyniu do mieszania wymieszaj zawartość saszetki Dawka 2 (Saszetka A i Saszetka B) z co najmniej 16 fl oz (450 ml) wody łyżką lub wstrząsając do momentu całkowitego rozpuszczenia. Może to potrwać do 2–3 minut. Nie spiesz się—powoli przyjmij dawkę w ciągu 30 minut.
2. Ponownie napełnij pojemnik co najmniej 16 fl oz (450 ml) klarownego płynu. Spokojnie wypij całość w ciągu 30 minut.



\*„Schemat jednodniowego dawkowania rano” (zgodnie z nazwą w Charakterystyce produktu leczniczego) nazywany jest „Dawkowanie w dniu kolonoskopii rano”.

**POMOCNA WSKAZÓWKA: PLENVU® można przechowywać w lodówce. Zużyć w ciągu 6 godzin od zmieszania z wodą**

#### WSKAZANIE

PLENVU® (glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy, chlorek sodu i chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego) to lek wydawany na receptę stosowany przez dorosłych w celu oczyszczenia jelita grubego przed kolonoskopią.

#### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Nie przyjmować leku PLENVU®, jeśli występuje niedrożność jelit

(zaparcia), dziura w ścianie żołądka lub jelita (perforacja jelita), problemy z usuwaniem pokarmu i płynów z żołądka (zatrzymanie pracy żołądka), problemy ze zbyt wolnym przesuwaniem się treści pokarmowej przez jelita (niedrożność jelit), bardzo rozszerzone jelito grube lub alergia na którykolwiek ze składników leku PLENVU®.

**Patrz dodatkowe Ważne informacje na temat bezpieczeństwa na odwrocie i dołączona Pełna charakterystyka produktu leczniczego oraz Poradnik przyjmowania leku i Instrukcja użycia.**

# W celu dobrego przygotowania do zabiegu zadbaj o nawodnienie

## Ważne jest, aby zadbać o nawodnienie przed przyjęciem, w trakcie przyjmowania i po przyjęciu leku PLENVU®.

Nie trzeba pić jedynie wody — można wybrać inny klarowny płyn. Przykłady klarownych płynów:

- Klarowny napój
- Czysty rosół
- Przecedzona lemoniada z limonką lub cytryn
- Galaretki (bez owoców i posypek)
- Napoje izotoniczne
- Rozcieńczony klarowny sok owocowy (bez miąższu)
- Kawa/herbata (bez mleka)
- Lody wodne na patyku (bez kawałków owoców i miąższu)

**Nie pić alkoholu, mleka, napojów w kolorze czerwonym lub fioletowym ani niczego z miąższem.**

**Należy zaprzestać picia płynów na co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią lub zgodnie z zaleceniem lekarza.**

Więcej informacji na temat leku **PLENVU®** na stronie **myPLENVU.com** lub pod czynnym całodobowo bezpłatnym numerem telefonu **1-855-MY-PLENVU**

### WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)

- Ważne jest, aby pić odpowiednią ilość klarownych płynów przed przyjmowaniem, w trakcie przyjmowania i po przyjęciu leku PLENVU®. Należy koniecznie przyjąć dodatkowe klarowne płyny po pierwszej i drugiej dawce leku PLENVU®. Przyjmowanie płynów należy zakończyć na 2 godziny przed kolonoskopią.
  - Przed przyjęciem leku PLENVU® należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent ma:
    - problemy z poważną utratą płynów ustrojowych (odwodnienie) i zmianami poziomu soli (elektrolitów) w organizmie.
    - problemy z sercem lub przyjmuje leki na serce. Lekarz może rozważyć wykonanie elektrokardiogramu (EKG), jeśli u pacjenta występuje ryzyko zaburzenia rytmu serca.
    - w wywiadzie napady padaczkowe lub przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych.
    - problemy z nerkami lub przyjmuje leki, które wpływają na czynność nerek. Lekarz może zlecić wykonanie testów krwi przed kolonoskopią i po kolonoskopii.
    - w wywiadzie problemy z żołądkiem lub jelitami, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niedrożność jelit lub podejrzenie przedziurawienia ściany żołądka lub jelit.
    - problemy z przełykaniem, refluks żołądkowy lub zachtystywanie się pokarmem lub płynami do płuc podczas jedzenia lub picia (aspiracja).
    - schorzenie o nazwie niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G6PD), które niszczy czerwone krwinki.
    - pacjent odstawia alkohol.
    - ma fenyloketonurię. Lek PLENVU® zawiera aspartam w ilości odpowiadającej 491 mg fenyloalaniny we wszystkich dawkach całej terapii.
  - pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
  - jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.
  - PLENVU® może wpływać na działanie innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta (w tym o lekach wydawanych na receptę, bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych) przed przyjęciem leku PLENVU®. Nie przyjmować leków doustnych w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu każdej dawki leku PLENVU®.
  - Objawy ciężkich reakcji alergicznych mogą obejmować wysypkę skórą, wypukłe, czerwone wypryski na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, ust, języka i gardła oraz problemy z nerkami.
  - W badaniach klinicznych nad lekiem PLENVU® najczęstsze działania niepożądane u pacjentów przyjmujących lek PLENVU® obejmowały nudności, wymioty, odwodnienie i uczucie dyskomfortu/ból w jamie brzusznej.
- Pacjenci powinni zgłaszać działania niepożądane leków wydawanych na receptę do Agencji Żywności i Leków (FDA). Strona internetowa [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) lub numer telefonu 1-800-FDA-1088.
- Informacje na temat produktu, raporty zdarzeń niepożądanych i raporty skarg związanych z produktem można uzyskać:
- w informacyjnym call center Salix  
Telefon: 1-800-321-4576  
Faks: 1-510-595-8183  
E-mail: [salixmc@dlss.com](mailto:salixmc@dlss.com)
- Patrz dodatkowe Ważne informacje na temat bezpieczeństwa z przodu i dołączona Pełna charakterystyka produktu leczniczego oraz Poradnik przyjmowania leku i Instrukcja użycia.**



