

准备好进行结肠镜检查了吗？ 服用 PLENVU® 的提示



PLENVU® 有 2 种给药口味，可提供良好的肠道准备体验*

严格按照医嘱服用 PLENVU® 非常重要。您的医疗保健提供者将会告诉您采用 2 天分
开给药方案还是 1 天上午给药方案。†



第 1 剂：芒果味 第 2 剂：水果味袋装

服用 PLENVU® 时，应参阅用法说明，但请牢记以下步骤：

第 1 剂(标有“第 1 剂”的袋子)： 日期 时间

1 /



使用提供的容器将 PLENVU® 粉剂与至少 16 盎司 (473 毫升) 水混合，直到完全溶解。这可能需要 2 到 3 分钟。

- 缓慢饮用，并在 30 分钟内将该剂量服用完毕
- 尝试用吸管饮用，并吃一些硬糖或薄荷糖 (不含红色、蓝色或紫色色素)

2 /



用至少 16 盎司 (473 毫升) 的透明液体 (如水或柠檬水) 重新注满同一个容器。

- 同样，在 30 分钟内饮用完毕

3 /



在服用两剂 PLENVU® 之间，饮用额外的透明液体。

- 例如水、姜味汽水、苏打水、清汤、运动饮料、透明果汁和冰棍 (不含果粒或果肉)

第 2 剂(A 袋和 B 袋)： 日期 时间

4 /



当您应该服用第 2 剂时，请对 A 袋和 B 袋 (一起服用) 重复步骤 1-3。



切记，您需要等到医疗保健提供者向您发出指示时，才能开始服用第二剂 PLENVU®。

注意：在结肠镜检查前至少 2 小时或根据医生的建议，停止饮用液体。您需要服用完两剂 PLENVU® 才能完成准备工作。严格按照医疗保健提供者的指示服用 PLENVU® 非常重要。PLENVU® 可能会影响其他药物的作用方式。如果您需要口服任何其他药物，请在开始服用每剂 PLENVU® 之前，提前至少 1 小时服用这些药物。

*基于临床试验期间服用 PLENVU® 或 Suprep® 的患者的日记评分。他们对以下方面的评分没有差异：用法说明的易遵循性、易饮用、肠道清洁效果和对日常活动的干扰。
†如果按指示采用 1 天上午给药方案，则应在安排的结肠镜检查的当天服用完这两剂。

其他有用提示

PLENVU® 可以冷藏

与水混合后
24 小时内可饮用



待在卫生间附近

您可能会在首次服用
PLENVU® 后 1 到 2 小
时内排便



避免饮用某些饮料

包括酒、牛奶、红色或
紫色液体，或含有果
肉的饮料



保持水分摄入

在准备之前、期间
和之后饮用透明
液体非常重要



观看如何服用 PLENVU®

扫描访问 myPLENVU.com/how-to-take 以了解完整的给药说明，
并观看有关 PLENVU® 便捷给药方案的视频

适应症

PLENVU® (聚乙二醇 3350、抗坏血酸钠、硫酸钠、抗坏血酸、氯化钠和氯化钾，用于制备口服溶液) 是供成人用于在结肠镜检查前清洗结肠的处方药。

重要安全性信息

- 如果您有肠阻塞 (肠梗阻)、胃肠壁开口 (肠穿孔)、胃内食物或液体排空问题 (胃潴留)、食物通过肠道移动过慢问题 (肠道机能性阻塞)、大肠扩张严重或对 PLENVU® 中的任何成分过敏，请勿服用 PLENVU®。

请参阅背面的其他重要安全性信息和随附的完整处方信息。

重要安全性信息 (续)

- PLENVU® 和其他肠道准备制剂可能会导致严重的副作用,包括体液流失(脱水)和血液中血盐(电解质)发生变化。这些变化可能导致心跳异常(从而可能导致死亡)、癫痫发作(即使您从未发作过)或肾脏问题。如果您有心脏问题、肾脏问题,或者在服用利尿剂、高血压药物或非甾体抗炎药(NSAIDs),服用 PLENVU® 后出现体液流失和体内盐分改变的可能性更高。
- 在您服用 PLENVU® 之后,您的医疗保健提供者可能会给您验血,以检查您的血液是否有变化。如果您出现任何体液流失过多(脱水)的症状(包括呕吐、头晕、心脏问题、肾脏问题、癫痫发作、口干、小便次数比正常情况少、头痛、晕眩、虚弱或头晕),尤其是在您站起来的时候,请立即告知您的医疗保健提供者。
- PLENVU® 可能导致肠溃疡或肠道问题(缺血性结肠炎)。如果您发生严重的胃部(腹部)疼痛或直肠出血,请立即告知您的医疗保健提供者。
- PLENVU® 可能会导致严重的过敏反应。这可能包括皮疹、瘙痒、皮肤上凸起的红色斑块(荨麻疹);面部、嘴唇、舌头和喉咙肿胀;以及肾脏问题。
- 服用 PLENVU® 的患者最常见的副作用是恶心、呕吐、脱水、胃部疼痛或不适。
- 在服用 PLENVU® 之前,请将您的所有病症和服用的所有药物(包括处方药、非处方药、维生素及草药补充剂)告知您的医疗保健提供者。

这些并非 PLENVU® 可能导致的所有副作用。请向您的医疗保健提供者了解更多信息。

我们鼓励您向 FDA 报告处方药的不良副作用。请访问 www.fda.gov/medwatch 或致电 1-800-FDA-1088。

有关产品信息、不良事件报告和产品投诉报告,请联系:

Salix 产品信息呼叫中心

电话: 1-800-321-4576

传真: 1-510-595-8183

电子邮箱: salixmc@dss.com

请参阅背面的其他重要安全性信息和随附的完整处方信息。



PLENVU 是经许可使用的 Norgine 集团公司的注册商标。Salix 徽标是 Salix Pharmaceuticals 附属实体的商标。

PLV.0078.USA.23 ©2023 Salix Pharmaceuticals 或其附属实体。 2023 年 10 月




使用指示
PLENVU® (plen-vu)
(聚乙二醇 3350、抗壞血酸鈉、硫酸鈉、抗壞血酸、氯化鈉及氯化鉀，用於口服溶液劑)

PLENVU 有兩種服用方案。醫療保健提供者會為您說明應採用兩日型分次劑量方案，或是一日型早晨劑量方案。


包裝提供下列內容：

• 外箱：



內箱包含：

• 第 1 劑



• 第 2 劑 A 袋及第 2 劑 B 袋（一併服用）



額外用品（不包含在包裝中）：

- 水（與 PLENVU 混合）。
- 剪刀（選用，沿虛線裁剪袋口）。
- 湯匙（選用，用於混合水與 PLENVU，也可以用蓋緊蓋子搖晃的方式，將水和 PLENVU 混合。請參閱下方 1c 步驟）。

PLENVU 重要資訊：

• 兩種用藥方案都必須喝完 PLENVU 第 1 劑（一袋）及第 2 劑（兩袋）的所有藥物。務必在大腸鏡檢查前至少 2 小時，喝完第 2 劑。**請勿**在 PLENVU 中加入任何其他成份。

• **請勿**將 PLENVU 與澱粉基增稠劑混合。

• PLENVU 必須加水混合。

• **服用 PLENVU 之前，當中和之後應飲用清激液體，直到大腸鏡檢查前 2 小時為止，以免體液喪失（脫水）以及血液中的鹽分（電解質）變化。**

額外攝取使用指示中列出的清激液體非常重要。

清激液體的範例：

- 水
- 清湯
- 花草茶、紅茶或咖啡
- （以澱粉液）加水（稀釋）的清激果汁（不含果肉），包括蘋果汁或白葡萄汁
- 透明汽水
- 食用明膠（不加水果或頂部裝飾）
- 冰棒（不含果粒或果肉）
- 篩濾萊姆水或檸檬水

• **請勿**食用或飲用酒精、牛奶、任何紅色或紫色的東西，或含有蔬果粒的其他任何食物。

• 服用 PLENVU 時**請勿**使用其他緩瀉劑。

• 如果您需要口服任何其他藥物，請在開始服用每劑 PLENVU 前至少 1 小時服用這些藥物。

• 服用 PLENVU 期間**請勿**攝取固態食物，直到大腸鏡檢查完成。

• 兩日型分次劑量方案：

- 大腸鏡檢查前一天，可以吃輕量早餐及輕量午餐。
- 您必須在開始服用 PLENVU 前至少 3 小時用完午餐。
- 開始服用 PLENVU 後，就只能喝清激液體。

• 一日型早晨劑量方案：

- 大腸鏡檢查前一天，可以吃輕量早餐及輕量午餐。晚餐可食用清湯或原味優格。
- 晚餐應在晚上 8 點前用完。
- 開始服用 PLENVU 後，就只能喝清激液體。

• 大腸鏡檢查當天上午**請勿**進食。

兩日型分次劑量方案

晚上吃第 1 劑，時間是下午 4 點到晚上 8 點之間。

隔天（大腸鏡檢查當天）早上吃第 2 劑。時間約為開始服用第 1 劑後 12 小時（凌晨 4 點到上午 8 點之間）。務必在大腸鏡檢查前至少 2 小時，喝完第 2 劑。

依照步驟 1 至 3 的說明，用湯匙或蓋緊上蓋搖晃的方式混合 PLENVU 溶液劑並服用：

步驟 1a：將第 1 劑倒入 PLENVU 隨附的混合容器。



步驟 1b：加水到填充線。必須加入至少 16 盎司（473 毫升）。



步驟 1c：用湯匙混合水和 PLENVU，或蓋緊混合容器的上蓋後搖晃混合兩者，直到完全溶解。可能需要 2 到 3 分鐘。



步驟 2：在 30 分鐘內喝完混合容器的內容物。如果您感到嚴重腹痛或不適，應暫時停止飲用 PLENVU，然後再繼續服用，或每次喝一小口 PLENVU，整個飲用過程超過 30 分鐘。如果還是嚴重腹痛，應致電醫療保健提供者。



步驟 3：用水沖洗混合容器，再次加入清激液體至填充線。至少需要 16 盎司（473 毫升）。在 30 分鐘內喝完混合容器的內容物。**晚上務必繼續額外攝取清激液體，以免脫水。**如需清激液體清單，可參閱使用指示頂部的範例。



您服用 PLENVU 後如果腹脹或胃部不適，應等到胃部狀況改善之後，再服用第 2 劑。

第 2 劑：用水沖洗混合容器。重複步驟 1、2、3，只是第 2 劑需要同時將兩個藥袋（第 2 劑 A 袋及第 2 劑 B 袋）倒入混合容器。

飲用 16 盎司（473 毫升）的水加 PLENVU 及 16 盎司（473 毫升）的清激液體後，**務必繼續額外攝取清激液體，以免脫水。**如需清激液體清單，可參閱使用指示頂部的範例。**您必須在大腸鏡檢查前至少 2 小時停止飲用所有液體。**



一日型早晨劑量方案

大腸鏡檢查當天早上服用第 1 劑，時間為凌晨 3 點到上午 7 點之間。

開始服用第 1 劑後約兩小時，再服用第 2 劑。務必在大腸鏡檢查前至少 2 小時，喝完第 2 劑。

依照步驟 1、2、3 的說明，用湯匙或蓋緊上蓋搖晃的方式混合 PLENVU 溶液劑並服用：

步驟 1a：將第 1 劑倒入 PLENVU 隨附的混合容器。



步驟 1b：加水到填充線。必須加入至少 16 盎司（473 毫升）。



步驟 1c：用湯匙混合水和 PLENVU，或蓋緊混合容器的上蓋後搖晃混合兩者，直到完全溶解。可能需要 2 到 3 分鐘。



步驟 2：在 30 分鐘內喝完混合容器的內容物。

如果您感到嚴重腹痛或不適，應暫時停止飲用 PLENVU，然後再繼續服用，或每次喝一小口 PLENVU，整個飲用過程超過 30 分鐘。如果還是嚴重腹痛，應致電醫療保健提供者。



步驟 3：用水沖洗混合容器。再次加入清激液體至填充線。至少需要 16 盎司（473 毫升）。在 30 分鐘內喝完混合容器的內容物。

飲用 16 盎司（473 毫升）的水加 PLENVU 及 16 盎司（473 毫升）的清激液體後，**在早上服用第 2 劑前務必繼續額外攝取清激液體，以免脫水。**如需清激液體清單，可參閱使用指示頂部的範例。**您必須在大腸鏡檢查前至少 2 小時停止飲用所有液體。**



您服用 PLENVU 後如果腹脹或胃部不適，應等到胃部狀況改善之後，再服用第 2 劑。

第 2 劑：用水沖洗混合容器。重複步驟 1、2、3，只是第 2 劑需要同時將兩個藥袋（第 2 劑 A 袋及第 2 劑 B 袋）倒入混合容器。

飲用 16 盎司（473 毫升）的水加 PLENVU 及 16 盎司（473 毫升）的清激液體後，**務必繼續額外攝取清激液體，以免脫水。**如需清激液體清單，可參閱使用指示頂部的範例。**您必須在大腸鏡檢查前至少 2 小時停止飲用所有液體。**



經銷商：

Salix Pharmaceuticals · Bausch Health US, LLC 之子公司
Bridgewater, NJ 08807 USA

製造廠：

Norgine Limited
7 Tir-y-berth Industrial Estate
New Road, Tir-y-berth
Hengoed, CF82 8SJ
United Kingdom (GB)

已獲專利。請參閱 <https://patents.salix.com> 以了解美國專利資訊。

PLENVU 為 Norgine 公司集團的註冊商標，依授權使用。

© 2023 Salix Pharmaceuticals, Inc. 或其關係企業

本使用指示已獲美國食品藥物管理局核准。

修訂日期：9/2023

9643003

REF-PLV-0400

70015340-01